

## **Листок-вкладыш – информация для пациента**

**Окскарбазепин Канон таблетки, 150 мг,  
покрытые пленочной оболочкой**

**Окскарбазепин Канон таблетки, 300 мг,  
покрытые пленочной оболочкой**

**Окскарбазепин Канон таблетки, 600 мг,  
покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: окскарбазепин

**Перед приёмом данного препарата полностью прочитайте этот листок, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.**

Сохраните этот листок. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные

нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Окскарбазепин Канон, и для чего его применяют.

2. О чём следует знать перед приемом препарата Окскарбазепин Канон.

3. Прием препарата Окскарбазепин Канон.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Окскарбазепин Канон.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### **1. Что из себя представляет препарат Окскарбазепин Канон, и для чего его применяют**

Препаратор Окскарбазепин Канон содержит действующее вещество окскарбазепин, относящееся к группе «противоэпилептические препараты; производные карбоксамида», то есть лекарства, применяемые для лечения приступов судорог (эпилепсии).

### **Показания к применению**

Препаратор Окскарбазепин Канон показан к применению у взрослых, подростков и детей в возрасте от 3 лет.

• Простые, сложные парциальные эпилептические приступы, с вторичной генерализацией или без нее.

• Генерализованные тонико-клонические эпилептические приступы.

### **Способ действия препарата Окскарбазепин Канон**

Эпилепсия – это заболевание головного мозга, которое вызывает у людей повторяющиеся приступы судорог. Судороги возникают из-за временного сбоя в электрической активности головного мозга, когда он беспорядочно посыпает слишком большое количество сигналов. Препаратор Окскарбазепин Канон помогает контролировать слишком выраженную электрическую активность головного мозга, предупреждая возникновение судорог или снижая частоту их возникновения. В результате Вам становится легче.

Препаратор Окскарбазепин Канон можно принимать отдельно или в комбинации с другими противоэпилептическими препаратами. Врач подберет то лечение, которое лучше всего подойдет именно Вам.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### **2. О чём следует знать перед приемом препарата Окскарбазепин Канон**

#### **Противопоказания**

##### **Не принимайте препарат Окскарбазепин Канон:**

• если у Вас аллергия на окскарбазепин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

• если у Вас аллергия на эсликарбазепин;

• если Вашему ребенку, которому назначен препарат, менее 3 лет (потому что лекарственная форма «таблетки» ему не подойдет).

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Окскарбазепин Канон проконсультируйтесь с лечащим врачом.

**Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом врачу перед тем, как начать лечение препаратором:**

• если у Вас раньше когда-либо была аллергия на карбамазепин;

• если у Вас проблемы с работой печени (нарушение функции печени тяжелой степени);

• если у Вас проблемы с работой почек, которое приводит к нарушению содержания натрия в крови

• если Вы принимаете какие-либо препараты, которые способствуют выведению натрия из организма (мочегонные препараты (диуретики), препараты, влияющие на секрецию антидиуретического гормона), особенно если Вы находитесь в пожилом возрасте – Вам потребуется определить концентрацию натрия в крови перед началом лечения и в дальнейшем во время лечения с определенной периодичностью;

• если у Вас проблемы с работой сердца (сердечная недостаточность, нарушение сердечной проводимости (атриовентрикулярная блокада, аритмия));

• если Вы принимаете противозачаточные таблетки (пероральные контрацептивы) – поскольку их эффективность может снизиться при одновременном приеме препарата Окскарбазепин Канон.

– Если во время приема препарата Окскарбазепин Канон у Вас появились мысли о причинении себе вреда или о самоубийстве, немедленно расскажите об этом врачу. Он окажет Вам всю необходимую помощь и Вам станет легче.

– Если во время приема препарата Окскарбазепин Канон у Вас возникла аллергия, симптомами которой могут быть сыпь, кожный зуд, крапивница, отек горла, языка, губ, век, затруднение дыхания, нарушение сознания, прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

– Если у Вас или Вашего ребенка, которому назначен препаратор Окскарбазепин Канон, ухудшилось течение эпилепсии во время лечения препаратором, прекратите прием препарата и обратитесь к врачу.

– Если у Вас появились головокружение, слабость, обмороки, одышка, кровоизлияния под кожу или из слизистых без причины, частые инфекционные заболевания, то это может говорить о том, что в Вашем организме нарушенна выработка клеток крови. Если Вы обнаружили у себя эти симптомы, как можно скорее обратитесь к лечащему врачу и расскажите о своих симптомах.

– Если во время приема препарата Окскарбазепин Канон появились симптомы (приведены в разделе 4 листка-вкладыша) синдрома Стивенса-Джонсона, синдрома Лайелла или эксссудативной мультиформной эритемы, прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

– Если у Вас появились симптомы воспаления печени – гепатит (боль или тяжесть в правом подреберье, общее недомогание,

обесцвечивание кала и потемнение мочи, желтушность кожи и белков глаз), как можно скорее сообщите об этом врачу. Он примет решение относительно Вашего дальнейшего лечения.

– До лечения и/или во время лечения препаратором врач может Вам периодически назначать сдавать анализ крови (например, для определения концентрации натрия в крови, для оценки числа клеток крови и так далее) для того, чтобы определить как препарат Окскарбазепин Канон влияет на Вас. Окскарбазепин хоть и крайне редко, но все же может вызывать снижение выработки гормонов щитовидной железы (гипотиреоз). Поэтому, учитывая влияние гормонов щитовидной железы на развитие детей (особенно в возрасте до 2 лет), до начала лечения и периодически во время лечения препаратором Окскарбазепин Канон, врач также будет контролировать концентрацию гормонов щитовидной железы в крови, если препарат был назначен ребенку.

### **Дети и подростки**

Не давайте препарат Окскарбазепин Канон детям в возрасте до 3 лет. У детей младше 3 лет окскарбазепин следует применять в форме суспензии для приема внутрь в связи с трудностями применения твердых лекарственных форм у этой возрастной группы. Обсудите это с лечащим врачом.

### **Другие препараты и Окскарбазепин Канон**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

**Обязательно сообщите врачу, если Вы принимали, принимаете сейчас или только собираетесь начать принимать какие-либо из препаратов, перечисленных ниже:**

• другие препараты, применяемые для лечения судорог (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин, клобазам, фелбамат, вальпроевая кислота, ламотриджин);

• препараты, применяемые для лечения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний (дигидропиридиновые антагонисты кальция, верапамил);

• препараты, применяемые для предотвращения беременности (пероральные контрацептивы);

• циклоспорин (препаратор, применяемый после пересадки органов для предотвращения их отторжения);

• рифампицин (препаратор, применяемый для лечения некоторых бактериальных инфекций, в том числе туберкулеза);

• препараты, применяемые для лечения некоторых психических заболеваний (вилоксазин, препараты лития).

### **Препаратор Окскарбазепин Канон с алкоголем**

Алкоголь может усиливать угнетающий (седативный) эффект препаратора Окскарбазепин Канон. По возможности избегайте одновременного приема препарата и алкоголя.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препаратора проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Женщинам, способным к рождению детей, во время лечения препаратором Окскарбазепин Канон необходимо применять надежные методы контрацепции (лучше всего внутриматочные контрацептивы), поскольку гормональные противозачаточные

могут снижать свою эффективность при одновременном приеме с препаратором Окскарбазепин Канон.

Если Вы беременны, то принимайте препаратор Окскарбазепин только в том случае, если его Вам назначил врач, зная о Вашей беременности. Во время беременности важно продолжать лечение эпилепсии, поэтому выполняйте все предписания Вашего врача.

Не принимайте препаратор Окскарбазепин Канон, если Вы кормите ребенка грудью, поскольку это может навредить Вашему ребенку.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

При приеме препаратора Окскарбазепин Канон могут наблюдаться головокружение, сонливость, расстройство координации движений (атаксия), двоение в глазах (диплопия), нечеткость зрения, нарушения зрения, снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия), и угнетение сознания или другие нарушения со стороны центральной нервной системы. При появлении описанных выше нежелательных явлений воздержитесь от управления транспортными средствами и механизмами. Если у Вас не наблюдаются эти нежелательные явления, то соблюдайте осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами в период применения препаратора, особенно в самом начале приема препаратора или во время подбора дозы.

### **3. Прием препаратора Окскарбазепин Канон**

Всегда принимайте препаратор в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

#### **Рекомендуемая доза:**

##### **Применение препаратора у взрослых**

• Обычная начальная доза для взрослых (в том числе для пациентов пожилого возраста без заболевания почек) составляет 600 мг в сутки.

• Суточную дозу рекомендуется разделить на 2 приема.

• Ваш врач может постепенно увеличивать дозу, чтобы подобрать подходящую для Вас дозу. Наилучшие результаты обычно достигаются при дозах от 600 до 2400 мг в сутки.

• Если Вы уже принимаете какое-либо другое противоэпилептическое лекарство, проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно необходимых доз препараторов.

• Если у Вас проблемы с работой почек, когда клиренс креатинина менее 30 мл/мин), начальная доза для Вас составит половину от обычной начальной дозы.

• Если у Вас тяжелое заболевание печени, лечащий врач может скорректировать принимаемую дозу препаратора. При легкой или средней степени нарушения работы печени дозу не корректируют.

### **Применение у детей и подростков**

Окскарбазепин Канон можно принимать детям старше 3 лет. Детям в возрасте менее 3 лет лучше подойдут препараторы окскарбазепина в форме суспензии для приема внутрь, поскольку они еще не умеют проглатывать таблетки и могут попасться. Проконсультируйтесь об этом с лечащим врачом или работником аптеки.

• Дозировка для детей зависит от их массы тела.

• Начальная доза составляет от 8 до 10 миллиграммов окскарбазепина на килограмм массы тела в сутки.

• Суточную дозу рекомендуется разделить на 2 приема.

• Врач может постепенно увеличивать дозу, чтобы подобрать оптимальную дозу для Вашего ребенка. Доза окскарбазепина не должна превышать 60 мг на килограмм массы тела в сутки.

### **Путь и (или) способ введения**

• Проглотите таблетку, запивая небольшим количеством воды.

• При необходимости таблетку с дозировкой 600 мг можно разделить пополам по риске, чтобы облегчить проглатывание половинки.

• Не делите таблетку, чтобы принять только половину дозы. Разделительная линия не предназначена для деления таблетки на равные дозы!

### **Продолжительность терапии**

Лечащий врач проконсультирует Вас о том, как долго будет длиться лечение препаратором Окскарбазепин Канон. Не изменяйте дозу и не прекращайте лечение, не посоветовавшись с лечащим врачом.

## **Если Вы приняли препарата Окскарбазепин Канон больше, чем следовало**

Если Вы приняли препарата больше, чем необходимо, то у Вас могут появиться такие симптомы как:

- сонливость, помрачнение сознания, головокружение, нарушение координации (атаксия), непроизвольные движения глаз (нистагм), дрожь в конечностях (тремор), судороги, головная боль, потеря сознания, длительная потеря сознания (кома), непроизвольные движения мышц (дискинезия);
- агрессия, нервозность (ажитация), спутанность сознания;
- двоение в глазах (диплопия), сужение зрачка (миоз), нечеткость зрения;
- низкое артериальное давление;
- одышка;
- тошнота, рвота, непроизвольные движения в мышцах (гиперкинезия);
- утомляемость;
- снижение концентрации натрия в крови;
- снижение частоты дыхательных движений, изменения на ЭКГ (удлиненный интервал QTc).

Если Вы приняли препарат слишком много, немедленно обратитесь в ближайшую больницу или к лечащему врачу.

## **Если Вы забыли принять препарат Окскарбазепин Канон**

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

**Если Вы прекратили прием препарата Окскарбазепин Канон**  
Резкое прекращение лечения препаратом Окскарбазепин Канон способно обострить Ваше заболевание, и частота судорожных припадков может сильно увеличиться. Не прекращайте принимать лекарство, пока врач не скажет Вам об этом. Если врач решит, что лечение этим препаратом Вам больше не нужно, то он Вам порекомендует как правильно постепенно от него отказаться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

## **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите прием препарата Окскарбазепин Канон и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникнут какие-либо из перечисленных ниже нежелательных реакций:**

- отек губ, век, лица, рта или горла, сопровождающиеся затруднением глотания и/или дыхания, кожная сыпь, зуд кожи, повышение температуры тела, головокружение, нарушение сознания, резкое снижение артериального давления, чувство страха, свист при дыхании, нарушение дыхания, **что может быть симптомами сильной аллергической реакции (анафилактическая реакция, ангионевротический отек, реакции гиперчувствительности, бронхоспазм)**, которая наблюдалась **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- кожная сыпь и/или лихорадка, отек век и лица, **что может быть симптомами сильной аллергической реакции на коже (лекарственная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез)**, которая наблюдалась с **неизвестной частотой** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно);
- образование волдырей, а затем больших пузырей (которые лопаются и обнажают раны) на коже и слизистых, в том числе губ, рта, глаз, половых органов, отшелушивание больших участков кожи, **что может быть симптомами угрожающей жизни аллергии на коже (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некроз (синдром Лайелла), мультиформная эритема)**, которая наблюдалась **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- судороги, сонливость, вялость, снижение артериального давления, угнетение или спутанность сознания, нарушение равновесия, головокружение, головная боль, мышечная слабость, подергивания мышц, значительное усиление судорог, **что может быть симптомами низкой концентрации натрия в Вашей крови (клинически значимая гипонатриемия)**, которая наблюдалась **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- усталость, одышка при физической нагрузке, бледность, головная боль, озноб, головокружение, частые инфекции, приводящие к лихорадке, к боли в горле, к язвам во рту, кровотечения или синяки чаще, чем обычно, красноватые или лиловые пятна или необъяснимые пятна на коже, **что может быть симптомами подавления выработки клеток крови в костном мозге (апластическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения, тромбоцитопения, нейтропения)**, которое наблюдалось **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- неравномерное сердцебиение, которое ощущается как замедление сердца, либо, наоборот, как ускорение сердцебиения, внеочередное сокращение сердца, ощущение перебоев, ощущение сердцебиения, боль в груди, обморок, слабость, одышка, **что может быть симптомами нарушения ритма сердца (атриовентрикулярная блокада, аритмия)**, которое наблюдалось **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- красная пятнистая сыпь, главным образом на лице, которая может сопровождаться усталостью, повышением температуры тела, плохим самочувствием и потерей аппетита, **что может быть симптомами системной красной волчанки (заболевание, когда иммунитет атакует собственный организм)**, которая наблюдалась **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- боль или тяжесть в правом подреберье, общее недомогание, обесцвечивание кала и потемнение мочи, желтушность кожи и белков глаз, **что может быть симптомами воспаления печени (гепатита)**, которое наблюдалось **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000);
- сильная боль в верхней части живота, тошнота, рвота, потеря аппетита, **что может быть симптомами воспаления поджелудочной железы (панкреатита)**, которое наблюдалось **очень редко** (может возникать не более чем у 1 человека из 10000).

**Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Окскарбазепин Канон:**

**Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):**

- сонливость, головная боль, головокружение;

- двоение в глазах (диплопия);

- рвота, тошнота;

- повышенная утомляемость.

**Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):**

- увеличение массы тела;

- снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия);

- нервозность (ажитация), эмоциональная нестабильность, спутанность сознания, депрессия, безразличие и равнодушие к окружающей жизни (апатия);

- нарушение координации (атаксия), дрожь в конечностях (тремор), непроизвольные движения глаз (нистагм), нарушение внимания, нарушение памяти (амнезия);

- нарушения зрения, затуманивание зрения;

- головокружение (вертиго);

- понос (диарея), боль в области живота, запор;

- кожная сыпь, выпадение волос (алопеция), угревая сыпь (акне);

- слабость, быстрая утомляемость (астения).

**Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):**

- снижение числа лейкоцитов в крови (лейкопения);

- крапивница;

- изменение в биохимическом анализе крови (повышение активности «печеночных» ферментов, щелочной фосфатазы в крови).

**Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):**

- недостаточность гормонов щитовидной железы (гипотиреоз);
- высокое артериальное давление (артериальная гипертензия);
- повышение активности ферментов липазы и/или амилазы;
- нарушения зрения (нечеткость зрения), рвота, тошнота, дефицит фолиевой кислоты;
- нарушения со стороны крови и лимфатической системы (эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, лимфаденопатия, спленомегалия);
- изменение показателей функции печени;
- боль в мышцах (миалгия);
- припухлость в области суставов, боль в суставах (артралгия);
- нарушение работы головного мозга вследствие нарушения работы печени (печеночная энцефалопатия);
- нарушение работы почек (почечная недостаточность, интерстициальный нефрит);
- белок в моче (протеинурия);
- отек легких, бронхиальная астма, поражение легких (интерстициальная болезнь легких), одышка.

**Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):**

- синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, проявляющийся длительным сном (летаргий), тошнотой, головокружением, снижением осмоляльности сыворотки крови, рвотой, головной болью, спутанностью сознания и другими симптомами со стороны нервной системы;
- нарушения речи (дизартрия), особенно в период повышения дозы;
- снижение минеральной плотности костной ткани (остеопения, остеопороз) и переломы у пациентов, получающих длительное лечение окскарбазепином;
- падение.

## **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата:

### **Российская Федерация**

Федеральная служба по надзору в сфере Здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Тел.: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Интернет-сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

## **5. Хранение препарата Окскарбазепин Канон**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Препарат Окскарбазепин Канон содержит**

Действующим веществом является окскарбазепин.

### **Окскарбазепин Канон, 150 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 150 мг окскарбазепина.

### **Окскарбазепин Канон, 300 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 300 мг окскарбазепина.

### **Окскарбазепин Канон, 600 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 600 мг окскарбазепина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипромеллоза 6 cps (гидроксипропилметилцеллюлоза), кремния диоксид коллоидный, кросповидон, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101).

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), тальк

титана диоксид (E171), краситель железа оксид желтый (E172), краситель железа оксид красный (E172).

### **Внешний вид препарата Окскарбазепин Канон и содержащие упаковки**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

### **Окскарбазепин Канон, 150 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе – белого или почти белого цвета

### **Окскарбазепин Канон, 300 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе – белого или почти белого цвета

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПВДХ или фольги алюминиевой жесткой многослойной ОПА/фольга/ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30 или 50 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата с вложением силикагеля. Крышка из полиэтилена или полипропилена. На банку наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

По 3, 5 контурных ячейковых упаковок или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105

Тел.: +7 (495) 797-99-54

Факс: +7 (495) 797-96-63

Электронная почта: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105

Тел.: +7 (495) 797-99-54

Факс: +7 (495) 797-96-63

Электронная почта: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

### **Листок-вкладыш пересмотрен**

### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org>.