

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Глицин форте**

**Регистрационный номер:** ЛП-№(007694)-(РГ-РУ)

**Торговое наименование:** Глицин форте

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** глицин

**Лекарственная форма:** таблетки зашечные

**Состав**

1 таблетка зашечная содержит:

*действующее вещество:* глицин 250,0 мг;  
*вспомогательные вещества:* аспартам 0,4 мг, коповидон 9,6 мг, магния стеарат 2,0 мг, сорбитол 8,0 мг.

**Описание**

Таблетки круглые двояковыпуклые с крестообразной риской, белого или почти белого цвета. Допускается незначительная мраморность.

**Фармакотерапевтическая группа:** другие средства для лечения заболеваний нервной системы.

**Код АТХ:** N07XX.

**Фармакологические свойства**

Заменяемая аминокислота, центральный нейромедиатор тормозного типа действия. Улучшает метаболические процессы в тканях мозга. Обладает антиоксидантным действием; регулирует деятельность глутаматных (NMDA) рецепторов, за счет чего уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность и конфликтность; улучшает социальную адаптацию и настроение; облегчает засыпание и нормализует сон; повышает умственную работоспособность; уменьшает выраженность вегетативно-сосудистых нарушений (в т.ч. и в климактерическом периоде) и общемозговых расстройств при ишемическом инсульте и черепно-мозговой травме. Снижает токсическое действие этанола на центральную нервную систему. Глицин оказывает также антидепрессивное и седативное действие, обладает ГАМК-ергическим, альфа1-адреноблокирующим и антитоксическим действием

**Фармакокинетика**

Легко проникает в большинство биологических жидкостей и тканей организма, в том числе в головной мозг, не кумулирует. Быстро разрушается в печени глицинооксидазой до воды и углекислого газа.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии ишемического инсульта.

В составе комплексной терапии различных функциональных и органических заболеваний нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (невроты, невротоподобные состояния, вегетососудистая дистония, последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, перинатальные и другие формы энцефалопатий (в т.ч. алкогольного генеза)).

В составе комплексной терапии девиантных форм поведения детей и подростков.

**Противопоказания**

- Гиперчувствительность к глицину и/или к любому вспомогательному веществу препарата.
- Беременность и период грудного вскармливания.

**С осторожностью**

- Артериальная гипотензия.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Препарат противопоказан при беременности, в связи с отсутствием достаточного количества данных о безопасности применения препарата в период беременности.

**Способ применения и дозы**

Применяется сублингвально (под язык) или трансбуккально (в таблетках или в виде порошка после измельчения таблеток).

**Взрослые:**

- При ишемическом инсульте: в течение первых 3-6 часов от развития инсульта назначают 1 г (4 таблетки) трансбуккально или сублингвально с 1 чайной ложкой воды, далее в течение 1-5 сут по 1 г/сут (по 4 таблетки), затем в течение последующих 30 сут. по ½- 1 таблетке 3 раза в сутки.

- При различных функциональных и органических заболеваниях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (невроты, невротоподобные состояния, вегетососудистая дистония, последствия нейроинфекций и черепно-мозговых травм, перинатальные и другие формы энцефалопатий (в т.ч. алкогольного генеза)): по ½ таблетки 2–3 раза в день, курс лечения – 7–14 дней. Его можно увеличить до 30 дней. При необходимости курс повторяют через 30 дней.

- При нарушениях сна назначают по 20 минут до сна или непосредственно перед сном по ¼–½ таблетки (в зависимости от возраста).
- В наркологии : по ½ таблетки 2–3 раза в день в течение 14–30 дней. При необходимости курсы повторяют 4–6 раз в год.

#### *Дети*

- При различных функциональных и органических заболеваниях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (неврозы, неврозоподобные состояния, вегетососудистая дистония, последствия нейротрофических и черепно-мозговых травм, перинатальные и другие формы энцефалопатий):
  - *Дети до 3 лет:* По ¼ таблетки 2 раза в день в течение 7–14 дней, в дальнейшем по ¼ таблетки 1 раз в день на протяжении 7–10 дней. Суточная доза – 100–150 мг, курсовая – 2–2,6 г.
  - *Дети старше 3 лет:* Режим дозирования для детей от 3 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.
- При девиантных формах поведения детей и подростков: по ½ таблетки 2–3 раза в день в течение 14–30 дней.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции, сонливость.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Ослабляет выраженность нежелательных реакций антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков), анксиолитиков, антидепрессантов, снотворных и противосудорожных лекарственных средств.

#### **Особые указания**

У пациентов со склонностью к артериальной гипотензии препарат применяется в меньших дозах и под контролем артериального давления, при его снижении ниже привычного уровня прием прекращается.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**

При приеме препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 60 или 90 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата. Крышка из полипропилена или полиэтилена. По 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2, 3 контурных ячейковых упаковки по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

#### **Срок годности**

4 года. Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

#### **Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей**

ЗАО «Канонфарма продакшн»,  
Российская Федерация  
141100, Московская обл., г.о. Щёлково,  
г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105  
Тел.: +7 (495) 797-99-54.

Электронный адрес: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

*Получить дополнительные данные о препарате, направить претензию на его качество, безопасность, сообщить о нежелательных лекарственных реакциях можно по телефону: 8 (800) 700-59-99 (бесплатная линия 24 часа) или на сайте [www.canonpharma.ru](http://www.canonpharma.ru) в разделе «Политика в области качества» - «Безопасность препаратов».*

#### **Производитель**

ЗАО «Канонфарма продакшн»,  
Российская Федерация

#### **Производство готовой лекарственной формы:**

Московская обл., г.о. Щёлково,  
г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 16

#### **Первичная упаковка:**

Московская обл., г.о. Щёлково,  
г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 16

#### **Вторичная (потребительская) упаковка:**

Московская обл., г.о. Щёлково,  
г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 16

#### **Выпускающий контроль качества:**

Московская обл., г.о. Щёлково,  
г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 11.  
Тел.: +7 (495) 797-99-54.  
[www.canonpharma.ru](http://www.canonpharma.ru)