

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
Инфлюцеин®, 30 мг, капсулы  
Инфлюцеин®, 45 мг, капсулы  
Инфлюцеин®, 75 мг, капсулы  
Действующее вещество: осельтамивир  
**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.** Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочесть его ещё раз.  
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.  
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.  
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.  
**Содержание листка-вкладыша**  
1. Что из себя представляет препарат Инфлюцеин®, и для чего его применяют.  
2. О чем следует знать перед приемом препарата Инфлюцеин®.  
3. Прием препарата Инфлюцеин®.  
4. Возможные нежелательные реакции.  
5. Хранение препарата Инфлюцеин®.  
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Инфлюцеин®, и для чего его применяют**

Препарат Инфлюцеин® содержит действующее вещество осельтамивир, которое относится к фармакотерапевтической группе под названием «противовирусные препараты системного действия; противовирусные препараты прямого действия; ингибиторы нейраминидазы» и является противовирусным препаратом (активен против вируса гриппа).

**Показания к применению**

Инфлюцеин® показан к применению у взрослых и детей от 1 года.

- Лечение гриппа у взрослых и детей в возрасте старше 1 года.
- Профилактика гриппа у взрослых и подростков в возрасте старше 12 лет, находящихся в группах повышенного риска инфицирования вирусом (в воинских частях и больших производственных коллективах, у ослабленных пациентов).
- Профилактика гриппа у детей старше 1 года.

**Способ действия препарата Инфлюцеин®**

Осельтамивир, содержащийся в препарате Инфлюцеин® оказывает избирательное блокирующее действие на фермент, запускающий процесс высвобождения вновь образовавшихся вирусных частиц из инфицированных клеток, предотвращая тем самым распространение вируса гриппа внутри организма.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед приемом препарата Инфлюцеин®**

**Противопоказания**

**Не принимайте препарат Инфлюцеин®:**

- если у Вас аллергия на осельтамивир или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас нарушение работы почек тяжелой степени (терминальная стадия почечной недостаточности);
- если у Вас нарушение работы печени тяжелой степени (тяжелая печеночная недостаточность).

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Инфлюцеин® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Это особенно важно:

- если у Вас тяжелое заболевание или состояние, которое может потребовать немедленную госпитализацию;
- если у Вас ослаблен иммунитет;
- если у Вас проблемы с сердцем или дыхательной системой (сердечная и/или дыхательная недостаточность);
- если у Вас проблемы с почками (почечная недостаточность);
- если Вы беременны или кормите грудью.

Это важно для того, чтобы врач в полной мере смог оценить, насколько безопасно назначать Вам данный препарат и потребуются ли изменение дозы и продолжительности его приема.

Препарат Инфлюцеин® эффективен только в отношении заболевания, вызванного вирусом гриппа. Данный препарат не является заменой вакцинации.

Защита от гриппа длится только до тех пор, пока применяется препарат Инфлюцеин®.

Немедленно сообщите врачу, если во время приема препарата у Вас изменится поведение или появятся какие-либо нарушения со стороны психики или нервной системы (психоневрологические нарушения).

**Дети**

Не давайте препарат Инфлюцеин® детям до 1 года.

**Другие препараты и препарат Инфлюцеин®**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Убедитесь, что Ваш лечащий врач знает, если Вы принимаете следующие лекарственные препараты:

- пробенецид (препарат, применяемый для лечения подагры);
- амоксицилин (препарат, применяемый для лечения инфекций, вызванных бактериями);
- хлорпропамид (препарат, применяемый для лечения сахарного диабета);
- метотрексат (препарат, применяемый для лечения некоторых форм рака или болезней, вызванных атакой собственного иммунитета);
- фенилбутазон (препарат, применяемый для лечения воспаления и боли).

**Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

При беременности и в период грудного вскармливания врач может назначить Вам данный препарат только в случае, если ожидаемая явная польза для матери превышает риск для ребенка.

**Управление транспортными средствами и работа с механизмами**  
Препарат Инфлюцеин® не оказывает влияния, либо оказывает слабое влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

**3. Прием препарата Инфлюцеин®**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

**Рекомендуемая доза:**

**Лечение гриппа у взрослых:** начинайте прием препарата не позднее 2 суток с момента развития симптомов заболевания. По 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 2 раза в сутки внутрь в течение 5 дней. Увеличение дозы более 150 мг/сутки не приводит к усилению эффекта.

**Профилактика гриппа у взрослых:** начинайте прием препарата не позднее 2 суток после контакта с заболевшим человеком. По 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 1 раз в сутки внутрь в течение не менее 10 дней после контакта с заболевшим человеком.

Во время сезонной эпидемии гриппа – по 75 мг 1 раз в сутки в течение 6 недель. Профилактическое действие продолжается столько, сколько длится прием препарата.

**Пациенты пожилого возраста**

Изменение дозы для профилактики или лечения гриппа не требуется.

**Пациенты с нарушением функции почек**

В случае, если у Вас нарушена функция почек, врач решит нужно ли Вам уменьшить дозу препарата Инфлюцеин®. Доза будет зависеть от тяжести Вашего заболевания почек. При необходимости или при проблемах с проглатыванием Вы можете приготовить жидкую или полужидкую смесь (суспензию) из капсулы (см. раздел 3 листка-вкладыша, подраздел «Путь и (или) способ введения»).

**Пациенты с нарушением функции печени**

Если у Вас имеются нарушения функции печени, проконсультируйтесь с врачом.

**Пациенты с ослабленным иммунитетом (после пересадки органа или ткани (трансплантации))**

Если у Вас ослаблен иммунитет, то врач может Вам назначить более длительный прием препарата Инфлюцеин®, чем обычно: для профилактики – 12 недель или для лечения гриппа – 10 дней. При этом изменение дозы не требуется.

**Применение у детей и подростков**

**Для лечения гриппа:**

Начинайте прием препарата не позднее 2 суток с момента развития симптомов заболевания.

**Подростки в возрасте ≥ 12 лет**

По 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 2 раза в сутки внутрь в течение 5 дней. Увеличение дозы более 150 мг/сутки не приводит к усилению эффекта.

**Дети в возрасте от 1 года до 12 лет**

Дети с массой тела больше 40 кг, которые умеют проглатывать капсулы, также могут получать лечение, принимая по 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 2 раза в сутки в течение 5 дней.

Для детей в возрасте от 1 года или если у Вашего ребенка существует проблема с проглатыванием капсул, Вы можете приготовить жидкую или полужидкую смесь (суспензию) с использованием капсул (см. раздел 3 листка-вкладыша, подраздел «Путь и (или) способ введения»).

Применять препарат следует 2 раза в сутки в течение 5 дней согласно нижеприведенной таблице:

| Масса тела   | Рекомендованная доза на один прием | Количество смеси препарата на один прием |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ≤ 15 кг      | 30 мг                              | 2 мл                                     |
| > 15 – 23 кг | 45 мг                              | 3 мл                                     |
| > 23 – 40 кг | 60 мг                              | 4 мл                                     |
| больше 40 кг | 75 мг                              | 5 мл                                     |

**Для профилактики гриппа:**

Начинайте прием препарата не позднее 2 суток после контакта с заболевшим человеком.

**Подростки в возрасте ≥ 12 лет**

По 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 1 раз в сутки внутрь в течение не менее 10 дней после контакта с заболевшим человеком. Во время сезонной эпидемии гриппа – по 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 1 раз в сутки в течение 6 недель.

Профилактическое действие продолжается столько, сколько длится прием препарата.

**Дети в возрасте от 1 года до 12 лет**

Дети с массой тела больше 40 кг, которые могут проглатывать капсулы, также могут получать профилактическую терапию, принимая по 75 мг (одна капсула 75 мг или одна капсула 30 мг + одна капсула 45 мг) 1 раз в сутки в течение 10 дней.

Для детей в возрасте от 1 года или если у Вашего ребенка существует проблема с проглатыванием капсул, Вы можете приготовить суспензию с использованием капсул (см. раздел 3 листка-вкладыша, подраздел «Путь и (или) способ введения»).

Применять препарат следует 1 раз в сутки в течение 10 дней согласно нижеприведенной таблице:

| Масса тела   | Рекомендованная доза на один прием | Количество смеси препарата на один прием |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ≤ 15 кг      | 30 мг                              | 2 мл                                     |
| > 15 – 23 кг | 45 мг                              | 3 мл                                     |
| > 23 – 40 кг | 60 мг                              | 4 мл                                     |
| больше 40 кг | 75 мг                              | 5 мл                                     |

**Путь и (или) способ введения**

Внутрь.

Во время еды или независимо от приема пищи. Переносимость препарата можно улучшить, если принимать его во время еды.

Если у Вас или Вашего ребенка существует проблема с проглатыванием капсул, Вы можете открыть капсулу в назначенной врачом дозе и высыпать ее содержимое в небольшое количество (максимально 1 чайная ложка) подходящего подслащенного продукта питания (шоколадный сироп с нормальным содержанием сахара или без содержания сахара, мед, светло-коричневый сахар или столовый сахар, растворенный в воде, сладкий десерт, густенное молоко с сахаром, яблочное пюре или йогурт) для того, чтобы скрыть горький вкус. Тщательно перемешайте смесь и выпейте или дайте выпить ребенку целиком. Проглотите смесь сразу же после приготовления.

*Если Вам требуются дозы 30-60 мг при наличии капсул 75 мг, то необходимо:*

1. Держа одну капсулу 75 мг препарата Инфлюцеин® над маленькой емкостью, аккуратно раскрыть ее и высыпать содержимое в емкость.
2. Добавьте к содержимому капсулы 5 мл воды с помощью шприца с метками, показывающими количество набранной жидкости. Тщательно перемешайте в течение 2х минут.
3. Наберите в шприц необходимое количество смеси из емкости согласно нижеприведенной таблице.

| Масса тела*  | Рекомендованная доза | Количество смеси осельтамивира на один прием |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ≤ 15 кг      | 30 мг                | 2 мл                                         |
| > 15 – 23 кг | 45 мг                | 3 мл                                         |
| > 23 – 40 кг | 60 мг                | 4 мл                                         |

\*Для детей с массой тела меньше или равной 40 кг, в возрасте от 1 до 8 лет.

Нет необходимости в заборе нерастворенного остатка, поскольку он является неактивным наполнителем. Нажав на поршень шприца, введите все его содержимое во вторую емкость. Оставшуюся неиспользованную смесь выбросьте.

4. Во вторую емкость добавьте небольшое количество (не более 1 чайной ложки) подходящего подслащенного продукта питания, чтобы скрыть горький вкус, и хорошо перемешайте.
5. Тщательно перемешайте смесь и выпейте ее сразу же после приготовления. Если в емкости осталось небольшое количество смеси, то ополосните емкость небольшим количеством воды и выпейте оставшуюся смесь.

Повторяйте данную процедуру перед каждым приемом препарата.  
*Приготовление суспензии с использованием капсул 30 мг и 45 мг*  
Для правильного дозирования:

1. Определите необходимое количество препарата Инфлюцеин, требующееся для приготовления смеси:

| Масса тела* | Количество капсул препарата Инфлюцеин для обеспечения рекомендованной дозы с целью лечения в течение 5 дней | Количество капсул препарата Инфлюцеин для обеспечения рекомендованной дозы с целью профилактики |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤ 15 кг     | 1 капсула 30 мг<br>2 раза/сут                                                                               | 1 капсула 30 мг 1 раз/сут                                                                       |
| > 15–23 кг  | 1 капсула 45 мг<br>2 раза/сут                                                                               | 1 капсула 45 мг 1 раз/сут                                                                       |
| > 23–40 кг  | 2 капсулы 30 мг<br>2 раза/сут                                                                               | 2 капсулы 30 мг 1 раз/сут                                                                       |

- \* – Дети с массой тела > 40 кг или в возрасте от 8 до 12 лет и взрослые могут получать препарат Осельтамивир, используя для приготовления смеси одну капсулу 45 мг + одну капсулу 30 мг 2 раза в сутки для лечения или 1 раз в сутки для профилактики.  
2. Убедитесь, что используется правильная доза препарата (в соответствии с вышеприведенной таблицей). Держа одну или несколько капсул препарата Инфлюцеин над маленькой емкостью, аккуратно раскройте одну или несколько капсул и высыпьте порошок в емкость.  
3. Добавьте небольшое количество (не более 1 чайной ложки) подходящего подслащенного продукта питания, чтобы скрыть горький вкус, и хорошо перемешайте.  
4. Тщательно перемешайте смесь и выпейте ее сразу же после приготовления. Если в емкости осталось небольшое количество смеси, то ополосните емкость небольшим количеством воды и выпейте оставшуюся смесь.

Повторяйте данную процедуру перед каждым приемом препарата.

**Если Вы приняли препарата Инфлюцеин® больше, чем следовало**  
Если Вы приняли препарат в дозе большей, чем следовало, немедленно проконсультируйтесь с врачом.

**Если Вы забыли принять препарат Инфлюцеин®**

Если Вы забыли принять препарат Инфлюцеин® вовремя, не принимайте двойную дозу для того, чтобы компенсировать пропущенную, примите следующую дозу в обычное время.

**Если Вы прекратили прием препарата Инфлюцеин®**

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат слишком рано, симптомы гриппа могут вернуться. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Инфлюцеин® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Сразу прекратите прием препарата Инфлюцеин® и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения тяжелых нежелательных реакций, которые наблюдались редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):**

- если у Вас появились тяжелые аллергические реакции, сопровождающиеся отеком лица и кожи, зудящей сыпью, низким кровяным давлением и затрудненным дыханием (анафилактические и анафилактоидные реакции);
- если у Вас наблюдается пожелтение кожи и белков глаз, изменение цвета стула, изменения в поведении, что может свидетельствовать о нарушениях со стороны печени (фульминантный гепатит, печеночная недостаточность);
- если у Вас внезапно появился сильный отек кожи, главным образом вокруг головы и шеи, включая глаза и язык, с затрудненным дыханием (ангионевротический отек);
- если у Вас развилась опасная для жизни аллергическая реакция, проявляющаяся сильным воспалением кожи, первоначально с лихорадкой, болью в горле и усталостью, кожной сыпью, приводящей к образованию пузырей, шелушению, отслаиванию больших участков кожи, возможным затруднениям дыхания и снижению артериального давления (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз);
- если Вы обнаружили выделение крови из прямой кишки, черный кал или произошла рвота кровью (желудочно-кишечное кровотечение);
- если Вы отмечаете беспокойство, аномальное поведение, тревожность, спутанность сознания, бред, помрачение сознания (делирий), галлюцинации, ночные кошмары, причинение себе телесного повреждения (психические нарушения).

**Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Инфлюцеин®, при лечении и профилактике гриппа у взрослых и подростков**

**Очень часто** (могут возникать у более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
  - тошнота.
- Часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- воспаление бронхов (бронхит);
  - простуда на губах (герпес);
  - воспаление носа и глотки (назофарингит);
  - инфекции верхних дыхательных путей;
  - воспаление пазух носа (синусит);
  - бессонница;
  - кашель;
  - боль в горле;
  - выделения из носа (ринорея);
  - рвота;
  - боль в животе (включая боль в верхней части живота);
  - нарушение пищеварения (диспепсия);
  - боль;
  - головокружение (вертиго);
  - утомляемость;
  - лихорадка;
  - боль в конечностях.

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительность);
- изменение сознания;
- судороги;
- нарушение ритма сердца (аритмия);
- повышение активности «печеночных» ферментов;
- заболевания кожи (экзема, дерматит);
- сыпь;
- крапивница.

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- снижение уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- нарушение зрения;
- воспаление толстой кишки (геморрагический колит);
- воспаление печени (гепатит);
- покраснение участков кожи с высыпаниями различной формы (мультиформная эритема).

**Дополнительные нежелательные реакции у детей:**

**Очень часто** (могут возникать у более чем у 1 человека из 10):

- кашель;
- заложенность носа;
- рвота.

**Часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- воспаление среднего уха (средний отит);
- головная боль;
- воспаление слизистой глаза (конъюнктивит, включая покраснение глаз, выделения и боль);
- боль в ухе;
- выделения из носа (ринорея);
- боль в животе (включая боль в верхней части живота);
- нарушение пищеварения (диспепсия);
- тошнота.

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- нарушения со стороны барабанной перепонки;
- воспаление кожи (дерматит, включая аллергический и атопический дерматит).

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

*Российская Федерация*

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

**5. Хранение препарата Инфлюцеин®**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на ячейковой контурной упаковке и картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

**6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат Инфлюцеин® содержит**

Действующим веществом является осельтамивир.

Инфлюцеин®, 30 мг, капсулы

Каждая капсула содержит 39,4 мг осельтамивира (в виде фосфата) в пересчете на 30,0 мг осельтамивира.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: Содержимое капсулы: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, кроскармеллоза натрия, натрия стеарил-фумарат, тальк.

Капсула твердая желатиновая:

Корпус: желатин, титана диоксид (E171). Крышечка: желатин, титана диоксид (E171).

Инфлюцеин®, 45 мг, капсулы

Каждая капсула содержит 59,1 мг осельтамивира (в виде фосфата) в пересчете на 45,0 мг осельтамивира.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: Содержимое капсулы: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, кроскармеллоза натрия, натрия стеарил-фумарат, тальк.

Капсула твердая желатиновая:

Корпус: желатин, титана диоксид (E171). Крышечка: желатин, титана диоксид (E171).

Инфлюцеин®, 75 мг, капсулы

Каждая капсула содержит 98,5 мг осельтамивира (в виде фосфата) в пересчете на 75,0 мг осельтамивира.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: Содержимое капсулы: кальция гидрофосфат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, кроскармеллоза натрия, натрия стеарил-фумарат, тальк.

Капсула твердая желатиновая:

Корпус: желатин, титана диоксид (E171). Крышечка: желатин, титана диоксид (E171), краситель хинолиновый желтый (E104), краситель железа оксид красный (E172).

**Внешний вид препарата Инфлюцеин® и содержимое упаковки**

Инфлюцеин®, 30 мг, капсулы

Твердые желатиновые капсулы №3, корпус и крышечка белого цвета.

Инфлюцеин®, 45 мг, капсулы

Твердые желатиновые капсулы №2, корпус и крышечка белого цвета.

Инфлюцеин®, 75 мг, капсулы

Твердые желатиновые капсулы №1, корпус белого цвета, крышечка желтого цвета.

Содержимое капсул – смесь гранул и порошка почти белого цвета или спрессованная масса почти белого цвета, рассыпающаяся при легком нажатии.

**Содержимое упаковки**

По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или пленки ПВХ/ПВДХ или пленки ПВХ/ПХТФЭ и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105

Тел.: +7 (495) 797-99-54, + 7 (800) 700-59-99 (бесплатная горячая линия 24 часа)

Адрес электронной почты: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105

Тел.: +7 (495) 797-99-54, + 7 (800) 700-59-99 (бесплатная горячая линия 24 часа)

Адрес электронной почты: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

**Листок-вкладыш пересмотрен 11.02.2025**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eec.eaunion.org/>