

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Артишок

Регистрационный номер:

ЛП-№(007717)-(РГ-У)

Торговое наименование: Артишок

Международное непатентованное или группировочное наименование: артишока листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покры- тые оболочкой

Состав

1 таблетка содержит:

действующее вещество: артишока листьев
экстракт сухой 200,00 мг;

вспомогательные вещества: крахмал куку-
рузный прежелатинизированный 22,00 мг,
магния трисиликат легкий 12,00 мг, магния
стеарат 3,75 мг, просолв (целлюлоза микро-
кристаллическая (тип 102) 98%; кремния
диоксид коллоидный 2%) 59, 25 мг, тальк
3,00 мг;

оболочка: ИсуПолиш®Р коричневый 385.04
FSC 50,00 мг, в том числе: гипромеллоза
(гидроксипропилметилцеллюлоза) 12,50 мг,
гуммиарабик 1,50 мг, сахароза 22,50 мг,
тальк 3,00 мг, титана диоксид 1,00 мг, краси-
тель железа оксид желтый 3,50 мг, краситель
железа оксид красный 3,50 мг, краситель же-
леза оксид черный 2,50 мг.

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, по-
крытые оболочкой от коричневого до
темно-коричневого цвета. На поперечном
разрезе ядро от светло-коричневого до
темно-коричневого цвета, с вкраплениями
более светлого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: желче-
гонное средство растительного происхож-
дения.

Код АТХ: A05AX

Фармакологические свойства

Фармакологический эффект препарата обу-
словлен комплексом входящих в его состав
листьев биологически активных веществ.
Цинарин в сочетании с фенолокислотами об-
ладает желчегонным, а также гепатопротек-

тивным действием. Аскорбиновая кислота,
каротин, витамины В₁ и В₂, инулин способ-
ствуют нормализации обменных процессов.
Обладает также диуретическим действием и
усиливает выведение мочевины.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной тера-
пии дискинезии желчевыводящих путей по
гипокинетическому типу, хронических не-
калькулезных холециститов, хронических
гепатитов, цирроза печени, хронического
нефрита, хронической почечной недостаточ-
ности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонен-
там препарата, желчнокаменная болезнь,
непроходимость (обтурация) желчевыво-
дящих путей, острые заболевания печени,
почек, желче- и мочевыводящих путей, тя-
желая гепатоцеллюлярная недостаточность.
Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.

Детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и
в период грудного вскармливания возмож-
но только по назначению и под контролем
врача.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослым по 2 – 3 таблетки 3 раза в день до
еды.

Детям старше 6-ти лет рекомендуется при-
нимать по 1 – 2 таблетки (в зависимости от
возраста) 3 раза в день до еды.

Курс лечения – 2 – 3 недели.

Проведение повторных курсов лечения воз-
можно по согласованию с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает
или симптомы усугубляются, или появля-
ются новые симптомы, необходимо прокон-
сультироваться с врачом. Применяйте пре-
парат только согласно тем показаниям, тому
способу применения и в тех дозах, которые
указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При дли-
тельном применении препарата в высоких
дозах возможно развитие диареи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

В случае развития тяжелой длительной диареи или абдоминальной боли прием препарата должен быть прекращен и следует обратиться к врачу. При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 2-х недель следует сообщить об этом врачу.

Суточная доза препарата содержит 0,040 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг.

По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 60 или 180 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена высокой плотности с крышкой навинчиваемой из полипропилена, обеспечивающей защиту от детей, или в банку из полиэтилена высокой плотности с крышкой натягиваемой из полиэтилена низкой плотности, или в банку из полиэтилена низкого давления с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия, или в банку из полиэтилентерефталата с крышкой навинчиваемой из полипропилена. Допустимо для контроля первого вскрытия использовать термоусадочную пленку из поливинилхлорида.

По 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2, 6 контурных ячейковых упаковок по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с инструкцией по применению (листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке картонной, банка в пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково,

г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105.

Тел.: +7 (495) 797-99-54

Электронный адрес: safety@canonpharma.ru

Получить дополнительные данные о препарате, направить претензию, на его качество, безопасность, сообщить о нежелательных лекарственных реакциях можно по телефону: 8 (800) 700-59-99 (бесплатная линия 24 часа) или на сайте www.canonpharma.ru в разделе «Политика в области качества» - «Безопасность препаратов».

Производитель

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

Производство готовой лекарственной формы

Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, стр.105Б, к. 16;

Первичная упаковка

Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, стр.105Б, к. 16;

Вторичная/потребительская упаковка

Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 16;

Выпускающий контроль качества

Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 11.

Тел.: +7 (495) 797-99-54

www.canonpharma.ru